

Lane Medical Library 1884
Ueber

transversale Inversion des Uterus.

Inaugural-Dissertation

welche nebst beigefügten Thesen

mit Genehmigung der

medizinischen Fakultät der Kgl. Universität Breslau

zur Erlangung der

Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie

Montag, den 24. März 1884, Vormittags 12 Uhr

in der Aula Leopoldina

gegen die Herren Opponenten

Erich Herrmann, Drd. med., und Eugen Schwartz, cand. med.

öffentlich vertheidigen wird

Maximilian / Paul

aus Breslau.

Breslau.

Druck der Breslauer Genossenschafts-Buchdruckerei, E. G.,
Ursulinerstrasse 1.

Inaugural Dissertation

von dem Herrn Doctor

und Professor der Rechte

an der Universität zu Gießen

Carl von Scharffenberg

am 24. März 1844

in der Aula der Universität

vorgetragen

von dem Herrn Doctor

und Professor der Rechte

an der Universität zu Gießen

Carl von Scharffenberg

am 24. März 1844

Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn Medicinalrath

Professor Dr. Heinrich Fritsch,

Director der Kgl. Gynäkologischen Klinik zu Breslau

in steter Hochachtung und Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.

System beschriebener Befunde

Ueber Medicinalstoffe

Professor Dr. Heinrich Ehrlich

Lehrer an der medicinischen Hochschule zu Berlin

in der 1. Abtheilung der Pharmazie

Verlag

von F. Vieweg

Die Veranlassung zu der vorliegenden Arbeit gab ein Fall von puerperaler Uterusinversion, welcher während des Sommers vorigen Jahres in der hiesigen königl. gynäkologischen Klinik aufgenommen und von dem Herrn Medicinalrath Professor Dr. Fritsch den Studirenden vorgestellt wurde. Für die Freundlichkeit, mir diesen Fall zum Zwecke der Veröffentlichung überwiesen zu haben, sowie für die Rathschläge und Unterstützungen, welche mir bei der Arbeit zu theil wurden, erlaube ich mir, an dieser Stelle meinem hochverehrten Herrn Lehrer meinen ergebensten Dank auszusprechen.

Zu den Erscheinungen auf dem gesammten Gebiete der Gynäkologie, welche durch die grosse Seltenheit ihres Vorkommens bemerkenswerth sind, gehört die Inversion des Uterus. Einen Beleg für diese Behauptung giebt Braun Lehrbuch der gesammten Gynäkologie, Wien 1881, p. 336), welcher berichtet, dass von 1849—1878 in der Wiener Gebäranstalt unter 250,000 Wöchnerinnen nicht eine einzige complete Inversion vorgekommen ist und dass er selbst und Späth ausser der Klinik nur einen einzigen Fall beobachtet hat; und Dr. Madden giebt an, dass im Rotunda-Hospitale zu Dublin seit der Gründung (1745) unter 190,000 Geburten nur ein einziger Fall dieser Art zur Beobachtung gekommen (Dublin journal of medical sciences, Novemb. 1870). Das gleiche Resultat liefern Angaben von Prof. Ashwell,

Schwartz (cf. Centralblatt f. Gynäkolog. 1877 p. 506) und Stadfeldt (cf. Centralblatt f. Gynäk. 1878, p. 463). Doch nicht bloss wegen der Seltenheit des Auftretens erweckt dieses Leiden von jeher das Interesse der Aerzte in hohem Grade, sondern auch in Anbetracht der Aetiologie, der öfter schwierigen Diagnose und ganz besonders der Mannigfaltigkeit und Schwierigkeit der Behandlung und lässt es der Mühe werth erscheinen, jeden einzelnen Fall zu veröffentlichen, da er doch immer wieder neue Eigenthümlichkeiten bietet. Im Allgemeinen kann man zwei Kategorien von Inversionen unterscheiden, nämlich einmal die Fälle, welche eine Folge sind von Tumoren, während die andern alle diejenigen Fälle ausmachen, welche während der Geburt oder kurz nach derselben, in den ersten Tagen, zustande kommen und welche man daher auch als die puerperalen Inversionen bezeichnet. Diese letzteren sind es, welche den Gegenstand der vorliegenden Arbeit bilden.

Was die Literatur über diesen Gegenstand anlangt, welche eine sehr reichhaltige ist — denn die Kenntniss der Inversion ist eine sehr alte, ja gewiss eben so alte, als Geburtshülfe getrieben wird — so kann es nicht meine Aufgabe sein, von der gesammten, wenn auch nur, soweit sie mir zugänglich wäre, an dieser Stelle Erwähnung zu thun, weil ich sonst mit dem Meister der gesammten Heilkunde, mit Hippokrates, anfangen müsste. Denn dass dieser die Inversio uteri gekannt habe, spricht folgende Stelle: „ἐκτρέπεται τὸ στόμα τῶν μητρῶν διὰ τοῦ ἀνέχοντος“ (cf. edit. Foes. p. 656 de morbis mulierum). Ich begnüge mich daher, die einschlägige Literatur der neuern Zeit, etwa der letzten 30 Jahre, hier zu berücksichtigen.

Fragen wir, welches die Ursachen der Uterusinversion sind, welche unter die gefährlichsten Erscheinungen beim neu entbundenen Weibe gehört und wobei selbst beim unvollkommenen Grade bald nach dessen Eintritt der Tod entweder durch Verblutung oder durch die Heftigkeit der Nerveineindrücke herbeigeführt werden kann, so sind mehrere dafür anzugeben. Als die häufigste Ursache finde ich be-

zeichnet die Unvorsichtigkeit und Unerfahrenheit der Hebammen, welche erschreckt durch die manchmal grössere Blutung als gewöhnlich nach der Geburt des Kindes oder veranlasst durch die grössere Zwischenzeit zwischen der Geburt des Kindes und der Placenta, in der Absicht, die Geburt rasch zu beenden, einen Zug an der Nabelschnur ausüben unbekümmert darum, ob es in der Wehenpause geschieht oder nicht, und so mit der Placenta den Uterus zu Tage befördern, während sie doch erwägen sollten, dass vor der Lösung der Placenta der Uterus, in Folge der Geburtsarbeit bei Ausstossung des Kindes ermüdet, im Zustande der Erschlaffung sich befindet und dieser Zustand der Erschlaffung der Uterusmuskulatur wiederum für die Entstehung des in Rede stehenden Uebels der geeignetste ist. Einen solchen Fall erzählt Abbot (cf. Bost. med. surg. journ. 1877 Mai p. 649) von einer Primipara. Nach kurzer Geburtsdauer zog die Hebamme die Nachgeburt an der Nabelschnur weg, wobei gleich die Inversion entstand. Der bald hierauf hinzugekommene Arzt fand die Patientin pulslos und den umgestülpten Uterus zwischen den Beinen. Obwohl die Reposition leicht ausführbar war, starb die Frau bald. Aehnliche Fälle berichten Nyrop (cf. Centralblatt f. Gynäk. 1877, p. 247), Breithweite (cf. Obstr. journ. of Great Britann. Mai 1878), Morgagni (cf. Centralblatt f. Gynäk. 1879, p. 126), Caskie (cf. Glasg. med. journ. April 1879), Depaul (Archives de Tocologie April 1879), Hue (Progr. med. 1879, Nr. 24), Späth (cf. Archiv f. Gynäk. X., p. 149), Vetterlein (cf. ebendasselbst p. 156), Grassi (cf. Centralblatt f. Gynäk. 1877, p. 227), Brunwell (cf. Brit. med. journ. 1878, Mai 11), Freund (cf. Zur Pathologie und Therapie der veralteten inversio uteri, Breslau 1870). Von den fünf in der Breslauer Klinik vorgekommenen Fällen sind auch zwei durch Zug an der Nabelschnur seitens der Hebamme entstanden. Alle diese endigten theils mit schnell eintretendem Tode, theils wurden sie ärztlich mit Erfolg, oder ohne solchen zu erzielen, behandelt. Einen Fall, in welchem durch besonders rohe Manipulationen der Hebamme im Nachgeburtsstadium die

betreffende Frau gelitten habe und wobei die Inversion zustande gekommen, beschreibt Mr. Clintock (cf. Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten 15. Berlin 1860 p. 313). Derselbe Verfasser spricht sich über diesen Punkt an einem andern Orte (cf. Clinical memoirs on diseases of women, Dublin 1873, p. 76) folgendermassen aus: „Ich fühle mich gezwungen, meine Ueberzeugung dahin auszusprechen, dass die Umstülpung des Uterus, wie sie während der Geburt vorkommt, stets durch eine fehlerhafte Behandlung der Entfernung der Placenta veranlasst worden ist, und berufe mich in dieser Beziehung auf die ausgedehnte Erfahrung von Clarke, Labatt, Collins, Kennedy und Johnston“; und Kiewisch's Ausspruch lautet: „Ein deutlicher Beweis, dass ein rohes Entbindungsverfahren die gewöhnliche Veranlassung des fraglichen Uebels gewesen, liegt in der Erfahrung, dass sein Vorkommen gegenwärtig, wo die Geburtshilfe nicht mehr in den Händen ganz ungebildeter Leute ist, täglich seltener wird“ (cf. Kiwisch, Klinische Vorträge 4. Auflage. Prag. 1854. I., p. 243). Auch lässt es sich leicht durch Thatsachen zeigen, dass dort, wo die Entbindungen von geübten und erfahrenen Händen vorgenommen oder wenigstens von ärztlicher Seite überwacht werden, wie es in den öffentlichen Gebäranstalten und in den höheren Ständen der Gesellschaft der Fall ist, dass also da die Umstülpung der Gebärmutter zu den Seltenheiten gehört.

Eine gleiche Wirkung, wie sie ein Anziehen des Nabelstranges während der Nachgeburtsperiode hervorruft, hat auch die Anwendung einer Gewalt von aussen auf den Uterus. Denn es genügt nur einige Momente kräftiges Drücken auf die untere Bauchgegend, um eine Inversion herzustellen. Einen solchen Fall berichtet Späth, um nur einen anzuführen, wo die Hebamme, um den Uterus zu Contractionen anzuregen, kräftiges Drücken und Massiren des Uterus oberhalb der Symphyse vornahm und dadurch denselben vollständig invertirt und paralytisch durch die Vulva hinausdrängte. Die Blutung nahm dabei so rapide und vehement überhand, dass Verfasser, alsbald hinzugerufen, nicht mehr

im Stande war, die ganz anämische Frau zu retten, obwohl ohne Schwierigkeit das schlaffe Organ sich reponiren liess. (Cf. Archiv f. Gynäk. Berlin 1876. X. p. 154). Ein ähnlicher Fall findet sich in der Monatsschrift f. Geburtsk. und Frauenkrankh. XXX., p. 1., in welchem die Inversion, nachdem die Geburt wegen fortwährender Wehenschwäche mit der Zange beendet war, bei dünnwandigem und schlaffem Uterus unter der die Placenta mittelst des Crede'schen Handgriffes ausdrückenden Hand des Geburtshelfers erfolgte. Mit Recht hebt daher Stadfeldt (cf. Centralblatt f. Gynäk. 1878, p. 143) hervor, dass man höchstens ein leichtes Reiben am Fundus den Hebammen gestatten sollte, die andern Handgriffe dagegen nicht, weil, diese ihren Händen anvertraut, die Möglichkeit grosser Gefahren für die Kreissenden einschliessen, da die Hebammen die Methode nicht in ihrer Totalität verstehen.

In einigen Fällen ist es der durch die Bauchpresse ausgeübte Druck, welcher die Nachbarorgane gegen den Uterusgrund drückt und auf diese Weise die Inversion veranlasst. Von diesen Fällen finden sich zwei im Centralblatt f. Gynäk. 1877, p. 143. Hickmann, Verfasser dieses Berichtes, hatte es in dem einen Falle für nöthig gehalten, im 8. Monat der Schwangerschaft die künstliche Frühgeburt einzuleiten. Es erfolgte darauf die Geburt eines lebenden Kindes. Die Placenta wurde spontan ausgestossen. Der Uterus war durch die Bauchdecken gut contrahirt zu fühlen. 5 Minuten darauf trat Blutung ein und Erbrechen, wobei die Inversion entstand. Im zweiten Falle war nach einer normalen Geburt am nächsten Tage Erbrechen eingetreten und darauf Schmerzen und Harnbeschwerden empfunden worden. Die Untersuchung ergab inversio uteri. Ein dritter Fall ist überliefert von Birnbaum (cf. Monatssch. f. Geburtsk. und Frauenkrankh. XX. p. 194). Die Frau hatte unter anhaltendem stürmischem Mitpressen bis zuletzt sehr leichtgeboren. Am 4. Tage des Wochenbettes trat plötzlich, als sie sich aufrichtete, eine runde rothe Geschwulst vor die Geschlechtstheile, welche als invertirter Uterus erkannt wurde.

Die Inversion war wahrscheinlich bei der Geburt vorbereitet worden und hat sich dann vollständig entwickelt. Ein anderer Fall ist schon darum interessant, weil er der einzige in der Breslauer Klinik selbst vorgekommene Fall ist (cf. Archiv f. Gynäk. XVI., p. 242). Die betreffende Schwangere kam im 9. Monat der Schwangerschaft in die Klinik wegen starker Blutung. Es erfolgte daselbst der Blasensprung und bald darauf unter heftigem Wehendrange die Geburt des Kindes und der Placenta, hinter denen grosse Stücken schwarzen Blutes hervorschossen. Die den Uterus haltende Hand fühlte denselben in diesem Augenblick nicht mehr, die Umstülpung war eingetreten. In den beiden letzten Fällen hinderte auch die schnelle Entleerung des Uterus die Retraction und es ist somit neben der direkten Ursache der Umstülpung, dem Bauchpressendrucke, auch die präcipitirte erfolgte Geburt als Ursache anzusprechen.

Als einen weitem Grund für das Zustandekommen der Uterusinversion führt Hennig (Archiv f. Gynäk. VII., p. 497) besonders dünne Uterinwände an. Von den beiden Fällen, welche er dabei erwähnt, ist der eine erzählt von Baudelocque (cf. Dailliez, Renversement de la matrice, thèse de Paris 1804) und der andere von Berry (cf. John Green Crosse, Provinc. journ. In. 11 1844). Letzterer giebt ausdrücklich an, dass die Wände des umgestülpten Uterus stellenweise nur 4 mm. dick waren. Zu diesen zwei Fällen füge ich zwei weitere hinzu, in denen auch von einer auffallenden Dünnwandigkeit des Organs gesprochen wird. Der eine Fall ist der bereits oben genannte (cf. p. 4). In demselben ist nach der Ansicht des die Entbindung vollziehenden Arztes die Umstülpung eine Folge der allzugrossen Dünnwandigkeit des Uterus, während Hennig und Spiegelberg (cf. Archiv f. Gynäk. VII., p. 494 und Lehrbuch der Geburtshülfe 1882, p. 544) denselben bloss als eine Folge des manuellen Druckes zum Zwecke der Expression der Nachgeburt ansehen. Der zweite Fall ist berichtet von Tambourer in der Petersburger med. Wochenschrift 1882, Nr. 39. In demselben war bei einer 23jährigen Erstgebärenden wegen Wehenschwäche die Zange

angelegt worden. Eine halbe Stunde nach der Geburt des Kindes trat bei einem leichten Hustenstoss plötzlich eine complete Inversion ein. Es wurde nun die etwas adhärente Placenta mit Leichtigkeit gelöst, wobei eine starke Blutung eintrat, und die Reposition des Uterus dann mit Erfolg vorgenommen. Bei dieser Gelegenheit wurde „eine sehr dünne Beschaffenheit der Gebärmutter constatirt.“

In einer Anzahl von Fällen ist als Veranlassung zu der Inversion die manuelle Lösung der adhärennten Placenta anzusprechen, indem zunächst diese eine Einstülpung verursacht, aus der dann von selbst dadurch, dass das eingestülpte Stück wie ein Fremdkörper von dem sich contrahirenden Uterus ausgestossen wird, sich die vollständige Inversion entwickelt. Unter diesen Fällen ist der eine (cf. Stadfeldt Centralblatt f. Gynäk. 1878, p. 463) merkwürdig. Es war in diesem bei anhaltender Atonie des Uterus nach einer Zangengeburt die Placenta mittelst des Credé'schen Handgriffes entfernt worden. Da aber dabei das Chorion in dem Uterus zurückgeblieben war, so wurde, um dieses noch herauszubefördern, die Hand eingeführt. Als dieses geschehen war, war auch eine vollständige *inversio uteri* vorhanden. Ein anderer Fall (cf. Ford. Brit. med. journ. 1878 Juni) betrifft eine Primipara, bei welcher nach einer normal verlaufenen Austreibungszeit des Kindes die Nachgeburt unter grossem Blutverluste der Frau manuell entfernt worden war. Eine Inversion wurde dabei nicht bemerkt. Am ersten Tage darauf folgten starke Nachwehen und am zweiten wurde bei dem Versuche zu kateterisiren der invertirte Uterus in der Vagina entdeckt, was am Tage zuvor nicht der Fall war. Ein dritter Fall ist mitgetheilt von E. H. Stevens (cf. Boston med. and. surg. journ. 1879 Febr. 20). Eine 22jährige Primipara machte eine 5 Tage dauernde schwere Entbindung durch. Die Nachgeburt, welche adhärent war, wurde manuell gelöst. Es erfolgte von da ab fast ununterbrochener Blutverlust, so dass Patientin fast ganz exsanguinirt aussah. 9 Monate 4 Tage nach der Geburt stellte Verfasser die Diagnose der totalen Inversion, welche schon lange Zeit bestand. Ein anderer

Fall wurde vorgetragen in der med. Gesellschaft in Kopenhagen von Prof. Dr. Howitz. Frau S., 26 Jahre alt, kam am 15. Aug. 1880 in das Hospital von Frederiksberg. 14 Monate früher war sie im ersten Wochenbett von einem lebenden Kinde entbunden worden. Vor der Geburt der Placenta fing eine starke Hämorrhagie an. Die Hebamme suchte vergebens die Placenta herauszubefördern und da dieselbe der Aussage nach ziemlich fest sass, wurde ein Arzt geholt, welcher 3 Stunden nach der Geburt die Placenta löste. Von da ab hatte Patientin eine Blutung nach dem andern und bildete sich bald darauf die vollständige Inversion. Ein weiterer Fall ist überliefert von Sympton (cf. Brit. med. journ. 1881, p. 121). Die Geburt hatte auch hier lange gedauert und war schwer gewesen. Die Lösung der angewachsenen Placenta war schwierig und es kam dabei gleich zu einer partiellen Inversion. Im 6. Falle hatte gleichfalls die Geburt lange gedauert (cf. Macdonald, Edinburgh. med. journ. 1881 Sept). Auf die manuelle Lösung der Placenta waren eine beträchtliche Blutung, Schmerz im Unterleibe und Schwäche gefolgt. Am folgenden Tage Abends trat ein Körper aus der Vagina heraus, unter heftigen Schmerzen, den der hinzugerufene Arzt als den invertirten Uterus erkannte. Der letzte Fall (cf. Archiv f. Gynäk. X. p. 159) endlich ist dadurch von Interesse, dass schon bei den drei früheren Entbindungen die manuelle Lösung der Placenta hatte vorgenommen werden müssen. Bei der vierten Entbindung wurde der Verfasser, der auch die früheren Entbindungen geleitet hatte, vorsichtshalber wieder an das Geburtsbett dieser Frau gerufen, und noch unterwegs vor dem Eintritte einer die Placentarlösung überdauernden, sehr bedeutenden Blutung benachrichtigt. Die hülfeleistende Hebamme zeigte die vollständige Placenta, so dass also die Blutung von einem abgerissenen und im Uterus zurückgebliebenen Reste derselben nicht herrühren konnte. Bei der Untersuchung zeigte sich, dass die Scheide von einem kugeligen, kindskopfgrossen Körper ausgefüllt war, welcher der invertirte Uterus war.

Weiter kommt bei der Bildung der Inversion die Schwere der Placenta in Betracht, zumal wenn der Uterus und namentlich sein oberer Abschnitt dünnwandig und schlaff ist. Auch behauptet Morgagni (de sed. 48, 17), dass die erblich kranke, also syphilitische Placenta massiger und schwerer ist, als eine gleich alte und gesunde. Die Umstände werden natürlich noch verstärkt, wenn die Frau stehend oder kauern gebärt, also von der Geburt überrascht wird. Einen solchen Fall, welcher sicher für die Schwere der Placenta als Grund der Inversion heranzuziehen ist, erzählt W. Atla (cf. American. Journ. of med. scienc. 1880 Jan.) Eine magere, anämische Frau von 29 Jahren abortirte in der Mitte des 7. Schwangerschaftsmonats, nachdem sie vorher eine schwere Last gehoben. Blut floss eine Woche hindurch ab, an deren Ende der Fötus abging. Ueber die Nachgeburt wusste die Frau nichts anzugeben. Seitdem fühlte sie sich immer unwohl und litt an unregelmässigen Blutungen. 3 Jahre nach dem Abortiren erfolgte ein reichlicher Bluterguss und dann Ohnmacht. Die nach Stillung der Blutung angestellte Untersuchung ergab eine vollständige Umstülpung des Uterus. Der Finger tastete in der Scheide einen unregelmässigen Körper, der sich wie ein fungöses Gewächs anfühlte und den man für die krebsartig erkrankte Cervix hielt. In Folge dessen wurde nun die Entfernung des invertirten Uterus beschlossen. Bei der Operation liess sich die in der Scheide gefühlte fleischige Masse mit einer Zange leicht entfernen und dieselbe als der Ueberrest einer alten adhären ten Placenta erkannt. Der zweite hierher gehörige Fall findet sich in der Wiener med. Wochenschrift 1882 No. 7, mitgetheilt von K. Breus. Eine 24jährige Frau, deren drei früheren Entbindungen normal waren, nur bei der dritten musste die Placenta gelöst werden, kam zum vierten Male nieder. Nach der Geburt eines lebenden Mädchens auf ganz normale Weise ging nicht mehr Blut als gewöhnlich ab. $\frac{1}{4}$ Stunde später wurde ein Theil der Placenta in der Vulva sichtbar und am fundus uteri zeigte sich eine muldenförmige Grube. Es fing an, mehr Blut abzugehen. Daher beabsichtigte man, die Entbundene

trocken zu legen, liess sie zu diesem Zwecke sich im Becken heben und zog ihr das Leintuch, auf welchem sie lag, hervor, um es zu wechseln. Da stürzte plötzlich die ganze Placenta und mit ihr der Uterus aus der Vulva hervor. Die Placenta war noch im ganzen Umfange am corpus uteri adhärent. Verfasser meint, die grössere Schwere und stellenweise stärkere Adhärenz der Placenta als Ursache der Inversion ansehen zu müssen.

Als eine weitere Veranlassung zur Umstülpung lässt sich die noch anhaftende Placenta selbst ansehen, indem diess dem Fruchthalter den Eindruck eines fremden, auszustossenden Körpers mittheilt, viel energischer, als der invaginirte Grund allein und so den reflektorischen Anstoss zur Contraction giebt. Ein Beispiel für diese Ansicht ist der von Alonso y Rubio (cf. *Anales de la Sociedad Ginecologica Española* 1878 p. 33) erzählte Fall, in welchem nach einer auf normale Schwangerschaft folgenden Entbindung einer Zweitgebärenden ohne weitere bekannte Ursache zugleich mit der Placenta adhärent die Gebärmutter folgte. In einem zweiten Falle (cf. *Burdol, Centralblatt f. Gynäk.* 1879 p. 375) erfolgte auch nach einer leichten Entbindung eine complete inversio uteri mit adhärenter Placenta unter normaler Blutung und ohne sonstige Ursache. Als dritter Fall hierfür ist ein Fall von Vetterlein (cf. *Archiv für Gynäk.* XI p. 159) anzusprechen. Bei einer 30jährigen Primipara hatte Verfasser wegen Insufficienz der Wehen mit der Zange die Geburt beendet. Während er darauf mit Wiederbelebungsversuchen des asphyktischen Kindes beschäftigt war, lenkte ein Schrei der die Nachgeburtsperiode überwachenden Hebamme seine Aufmerksamkeit auf die Wöchnerin, aus deren Schamspalte der umgestülpte Uterus mit der noch adhären-ten Placenta herausragte.

In anderen Fällen ist kurze Nabelschnur die Ursache. So in dem von Smith mitgetheilten (cf. *B. Smith, Monthly Journ. of med. sciens.* May 1846 p. 359). In diesem trübte sich während des Einschneidens der Schultern ein, die Kreissende klagte laut über das heftige Treten des Kin-

es mit seinen Füßen gegen den Grund des Fruchthalters. des letzteren war umgestülpt, ehe die kleine am Grunde sitzende Placenta abging. Der Nabelstrang war hier 16 cm lang. In einem anderen Falle war der Nabelstrang dadurch verkürzt, dass er zweimal um den Nacken, dreimal um ein Bein, einmal um einen Arm geschlungen (cf. Dailliez thèse obs. 9). Aehnlich Borham (cf. Monatsschrift für Geburtsk. II. 221), der Nabelstrang war zweimal um den Hals des Kindes gewickelt, und Ashwell (cf. Ashwell, deutsch von Mölder, Leipzig 1856 p. 202), die Nabelschnur war ungewöhnlich kurz, die Nachgeburt verwachsen. Auch der Fall von Bockenthal (cf. Monatsschrift f. Geburtsk. u. Frkr. XV. p. 313) gehört hierher. In ihm war die Nabelschnur mehrmals um das Kind geschlungen und so war wegen der Kürze derselben bei der mit der Zange vollendeten Geburt wahrscheinlich eine Einstülpung erzeugt worden, welche sich später zur völligen Inversion entwickelte.

Mehrere Forscher, zuerst Rokitansky, wurden auf die Möglichkeit einer nervösen Depression, einer Lähmung des der Placentarinsertion entsprechenden Anthells der Uteruswand aufmerksam, woraus dann die passive mechanische Depression folgt (cf. R., Lehrbuch der pathologischen Anatomie 1861, III. p. 501 und Duncan, Edinb. med. journ. XII. p. 982 Mai 1867), indem unter dem Einflusse der sich contrahirenden Umgebung die paralytische Stelle in die Höhle des Organs sinkt und dann wiederum wie ein Fremdkörper durch den Muttermund getrieben wird. Für diesen Grund lassen sich drei Fälle als Beispiele anführen. Eine Multipara hatte eine leichte Geburt, keine Blutung gehabt. 45 Minuten darnach fühlte sie plötzlich Harndrang und Schmerzen im Unterleibe. Die sofort angestellte Untersuchung ergab den Uterus invertirt, Placenta adhärent. Verfasser giebt ausdrücklich als Grund an Paralyse der Placentarstelle (cf. Hickmann, The Lancet p. 231). Ein ähnlicher Fall ist folgender: Bei einer 28jährigen Primipara war nach längerer träger Geburtsdauer das Kind mit der Zange entwickelt worden. Nach der später folgenden spontanen Expulsion

der Placenta wurde sofort eine partielle Inversion constatirt (cf. New-Yorker med. journ. 1878 Oct. u. Decbr.). Ebenfalls verhält es sich mit einem von Dr. Smith berichteten Fall, in dem auch die Placenta spontan $\frac{1}{2}$ Stunde nach der Geburt des Kindes kam. Der Uterus contrahirte sich darauf anfangs gut und später bildete sich die Inversion.

Endlich findet Hennig (cf. Archiv f. Gynäk. VII. p. 509) eine gelegentliche, aber sehr wirksame Ursache zur Umstülpung des Grundes in der zwar verhältnissmässig sehr seltenen Anheftung des Kuchens am Grunde des Fruchthalters. Dieselbe Ansicht spricht schon vor diesem John Green Crosse (cf. Provinc. journ. III. p. 301) aus: „The attachment of the placenta to some part of the internal surface of the fundus uteri is found to be so general in cases of inversion, that it may be regarded as almost essential to its production. It undoubtedly ranks among the most powerful predisposing causes.“ Er meint auch, dass die Placenta, ohne irgend krankhaft verwachsen zu sein, so fest am erschlafften Grunde haften könne, dass die Trennung, schon die Erkennung der Kuchengrenze schwierig sei und den weniger gewiegten Beobachter zur Annahme einer festen Insertion verleite. Er fügt auch zwei Fälle hinzu „inversio uteri, der Kuchen haftete noch am Grunde“ und „der unterste Theil der Geschwulst, der fundus uteri hatte ein rauhes Ansehen, welches die Stelle anzeigte, wo die Placenta angesessen hatte“. Ausser diesen beiden Fällen hat Hennig noch 23 Fälle von Inversion gefunden, in denen der Sitz des Kuchens am Fundus war. L. Atthlill (cf. Dublin med. journ. 1881 Juli p. 68) fand gleichfalls in zwei Fällen von Inversion den Fundus als die Insertionsstelle der Placenta und betont, dass diese seltene Einpflanzungsstelle der Grund der Umstülpung sei. Auch in einem in der Petersburger med. Wochenschrift 1882 mitgetheilten Falle saß die Placenta auf dem umgestülpten Fundus wie eine Kappe.

Schliesslich will ich noch einen sicherlich nur theoretisch ausgedachten Grund für die Inversion bemerken, welcher aber in der That nicht vorkommt, weil die Inversion über

aupst nicht so häufig ist, wie es der Fall sein müsste, wenn derselbe wirklich ein ätiologisches Moment bilden würde. Nach der Ansicht (cf. British medical journal 1872 II. p. 630) eines Dr. Joyce nämlich verhält sich die Placenta bei der Ausstossung aus dem Uterus zu demselben wie der Stempel einer Spritze und übt eine Saugkraft auf den Uterus aus, welche leicht die Inversion zur Folge haben soll. Zu vergleichen damit ist auch die Theorie von Theopold (cf. Deutsche Klinik 1873 No. 49) von der Bildung eines leeren Raumes.

Was die pathologisch-anatomischen Verhältnisse betrifft, so hebt Veit (cf. Handbuch der spec. Path. und Therap. Krankheiten der weibl. Geschlechtsorg. 1867 p. 344) hervor, dass in den drei von ihm beobachteten Fällen die Grenze der Inversion in der Gegend des inneren Muttermundes gewesen sei. Er sagt: „Bemerkenswerth erscheint uns ferner, dass in den von uns selbst beobachteten Fällen von Uterusinversion die Cervix an der Invagination nur theilnahm, wenn die Gebärmutter in oder vor die Schamspalte herabgezogen wurde. Mit dem Aufsteigen des Uterus verschwand sofort wieder die Umstülpung der Cervix, und die Umschlagsstelle wurde durch die Gegend des orificium internum gebildet. Ohne Zweifel wird es sich in allen Fällen gleichermassen verhalten.“ In dem von Freund (cf. Fr. zur Patholog. und Therap. der veralteten Inversionen 1870) beschriebenen Falle ist dieses Verhalten der Cervix das gleiche, nicht dagegen in einem von Spiegelberg (cf. Archiv f. Gynäk. IV. p. 356) beobachteten Falle. Denn in diesem fällt die Umschlagsstelle nur dann ungefähr in die Mitte des Halskanals, wenn man den Uteruskörper heraufdrückt, hält sich gewöhnlich also darunter. In einem Falle (cf. Rokitansky, Lehrb. der Path. u. Therap. 1861 III. 446) findet sich sogar eine Einstülpung der hinteren Blasenwand mit in den Inversionstrichter. Auch Einstülpung der vorderen Rectalwand soll vorkommen.

Die Symptome sind: anhaltende Menorrhagien, heftiger, quälender, drückender Schmerz in der Schooss- und Lenden-gegend, gestörte Lokomotion, gestörte Menstruation, Con-

ceptionsunfähigkeit, Ohnmachten, Erbrechen, Convulsionen und häufig Chokerscheinungen. In manchen Fällen kann auch zu den Erscheinungen der Darmquetschung und des Darmverschlusses kommen, wenn sich eine Darmschlinge den Inversionstrichter hineindrängt (cf. *Anales de la Sociedad Gin. Esp.* 1878). Wird der Zustand ein chronischer oder bildet sich die Inversion langsam heraus, so sind die Symptome schwächer und werden meist erst dann bei Steigerung des selben Gegenstand ärztlicher Beobachtung.

Bezüglich der Diagnose will ich nicht erwähnen, welcher Weise man vorzugehen hat, um dieselbe zu stellen, weil die verschiedenen Arten der Untersuchung durch die Bauchdecken, von der Scheide, vom Mastdarm und der Blase aus in jedem Lehrbuch der Gynäkologie zu finden sind. Hier will ich einzelne Fälle, in denen Irrthümer vorkommen, anführen und die Schwierigkeiten und Hindernisse erörtern, welche der Erforschung des Krankheitsbildes entgegenstehen und zu Irrthümern Veranlassung geben können. Wilson (cf. *The Lanet* Juni 1877) erzählt einen Fall, in welchem 12 Monate nach der Entbindung und Entstehung der Inversion der invertirte Uterus für einen fibrösen Polypen gehalten wurde. Der Irrthum war dadurch entstanden, dass der Körper stark durch den Muttermund comprimirt war, so dass er als Polypenstiel imponiren konnte, und klärte sich auf, als Verfasser denselben stark nach abwärts zog. Einen anderen Fall theilt Deleus (cf. *Progr. med.* 1880 No. 22) mit, in welchem er den invertirten Uterus für einen Polypen gehalten und abgetragen habe. Erst die mikroskopische Untersuchung habe ergeben, dass die Geschwulst der Uterus gewesen. Ebenso berichtet auch L. Atthlill (cf. *Dubl. med. journ.* 1881 Juli), dass in 4 von 5 zur Beobachtung gekommenen Fällen die Inversion nicht erkannt worden sei und Versuche gemacht worden seien, die Geschwulst zu entfernen. In manchen Fällen fehlt die Empfindlichkeit des umgestülpten Organes, so dass dieses Anlass geben kann, an eine Geschwulst zu denken. Auch kann die Dicke sehr straffer, fettreicher Bauchdecken es verhindern, den Zustand

es corpus uteri von hier aus zu constatiren. In solchen Fällen muss man dann mit der halben oder ganzen Hand in das Rectum eingehen. Auch kann hochgradige Atrophie mit Seitwärts- oder Rückwärtsbeugung des Uterus, wozu ein von einer Muttermundslippe ausgehender Tumor oder Hypertrophie einer solchen hinzutritt, zur irrthümlichen Annahme einer Inversion Veranlassung geben; namentlich wenn ein orificium externum kaum zu finden ist. Ein solcher Fall findet sich mitgetheilt in Klinische Beiträge zur Gynäk. Heft III. p. 165 bis 167, zur Behandlung der submukösen Uterushibroide. In demselben lag vor der Vulva ein doppelfaustgrosser Tumor von fast birnförmiger Gestalt. Eine deutlich erkennbare Theilungslinie trennte das untere Drittel der Geschwulst von blassgelber Farbe, derber Consistenz, grosshöckeriger Gestalt und Unempfindlichkeit gegen Nadelstiche, von dem oberen Theile, der dunkelrother und theilweise durch Gangrän schmutzig braun gefärbt war, weiche Consistenz und glatte Oberfläche besass und gegen Nadelstiche empfindlich war. Beim Umfassen der oberen dünneren Partie schien dieselbe eine Höhle in sich zu schliessen. Auf der Vorderfläche des oberen Drittels der Geschwulst sass ein weicher, länglicher Schleimpolyp. Oberhalb desselben gelangte man ziemlich hart am laquear vaginae an einen unebenen Wall, der sich rings um den Stiel der Geschwulst fortsetzte. Das laquear vaginae war in normaler Höhe zu fühlen, keine Spur dagegen von einem Muttermunde. Die Untersuchung durch den Mastdarm combinirt mit der von den Bauchdecken und Blase aus liess keinen für den Uterus anzusprechenden Körper an dem dem Uterus zukommenden Orte finden. Man gelangte dagegen vom Mastdarme aus in der Höhe des laquear vaginae mit der Fingerspitze nach abwärts in eine kleine trichterförmige Einsenkung. Tubenmündungen wurden an dem vermeintlich invertirten Organ nicht gefunden, was bei der gangränösen Zerstörung der Oberfläche natürlich schien. Es wurde also eine auf chronische Weise durch ein in die Wand des Fundus eingebettetes Fibroid entstandene vollständige Inversion angenommen. Bei nochmaliger Exploration

wurde die Geschwulst so tief als möglich herabgezogen und dabei an der Hinterfläche der bisher in der Scheide verborgen gewesenen Partie oberhalb des erwähnten Walles eine kleine rundliche Oeffnung gefunden, durch die die Uterussonde nach hinten links in die Gegend der *incisura ischiadica maior* kaum 5 cm eindrang. Bei der nun vom Mastdarm aus vorgenommenen Untersuchung zeigte sich, dass die Sonde in dem nach hinten links unten gebeugten, daselbst ziemlich straff fixirten, atrophischen Uterus lag, während die Geschwulst die kolossal vergrößerte, von einer Neubildung eingenommene, an der oberen Partie mit wallartig sich erhebenden Wucherungen und an der Vorderfläche mit einem Polypen versehene Muttermundslippe war. Mit einem Uterusprolaps, wie einige meinen, die Inversion zu verwechseln, ist meiner Ansicht nach wegen der Form nicht leicht möglich. Dagegen wird die Diagnose schwieriger, wenn von einem Inversionstrichter nichts zu fühlen ist, wie dieses in dem von Freund beschriebenen Falle zutraf, oder wenn an dem invertirten Uterus Ueberreste von einer anhaftenden Placenta vorhanden sind (cf. *Atla, Americ. journal of med. sciens.* 1880 Jan.).

Was die Prognose anlangt, so ist dieselbe meist schlecht zu stellen, weil, wenn die Inversion nicht beseitigt ist, in jedem Augenblicke die gefährlichen Erscheinungen auftreten können, selbst wenn auch einige Zeit hindurch vielleicht keine bedenklichen Symptome (cf. Ashwell, *Lehrbuch der Krankh. der weibl. Geschlechtsorg.* p. 200) aufgetreten sind.

Von der Behandlung der Inversion kann man wohl sagen, dass es kaum eine andere Krankheit giebt, welche eine solche Mannigfaltigkeit der Arten der Behandlung aufzuweisen hat, besonders was das instrumentelle Gebiet anlangt, da fast jeder Arzt für seinen Fall ein neues Instrument zu erfinden sich bemüht hat. Das einfachste und schnellste Verfahren dabei ist die manuelle Reposition, deren einfachste Art wiederum die Einführung der ganzen Hand in die Scheide, Umfassen des Tumors und Drücken nach oben oder Drücken nach oben mit der conisch zusammen gelegten Hand ist.

Weiter kann man die Reposition in der von Courty angegebenen Weise machen, indem man nämlich den Uterus mit einer Myzeux'schen Zange aus der Scheide hervorzieht, dann den zweiten oder dritten Finger der rechten Hand in das Rectum bis über die Douglas'schen Falten führt und so das Collum anhakt und dann mit der linken Hand den Körper gegen die Schamfuge drückt, welche Manipulationen man mehrere Male hinter einander macht. Eine andere Art der Reposition schlägt Dr. Nöggerath in New-York vor. Die Kranke in die Steinschnittlage gelegt, solle man den Uterus mit dem Zeige- und Mittelfinger auf der rechten Seite, während der Daumen links einen Punkt fixirt, der ungefähr ein Drittel der ganzen Länge vom tiefsten Punkte entfernt ist, erfassen und dann mit dem Daumen einen stetigen Druck nach innen und oben ausüben. Eine andere Art wiederum (cf. Pate, Cin. Lancet and Obstetr. 1878 März) ist folgende: Man führt zwei Finger der rechten Hand in das Rectum und hakt sie in den invertirten Cervikalring ein, der Zeigefinger der anderen Hand wird durch die leicht dilatirbare Vagina in die Blase eingeführt und auf gleiche Weise in den Cervikalring eingehakt. Indem nun diese Finger den Cervikalring fixiren und auseinanderzerren, drücken beide Daumen den Fundus nach oben. Wieder eine andere, etwas forcirtere Weise wendete Stevens (cf. Boston med. and. surg. Journ. 1879 Febr. 10) an. Er drückte den Fundus mit der rechten Hand nach oben, während zugleich die Cervix mit den Fingern erweitert wurde und er mit der linken Hand über der Symphyse einen Gegendruck ausübte. Eine letzte Art ist die, dass man an der einen Hand alle Finger bis auf den Zeigefinger einschlägt, während man diesen in den beiden ersten Gelenken krümmt, im dritten Gelenk aufstellt, ihn dann den Daumen heranlegt und mit diesen beiden einen Druck auf den umgestülpten Uterus ausübt. So sind auf diese oder jene angegebene Art unter 87 von mir daraufhin untersuchten Fällen 24 Inversionen reponirt worden. Indess muss man bei diesen Repositionsversuchen vorsichtig sein und man darf nicht dieselbe zu sehr forciren,

wie dieses ein Fall zeigt, den ich hier mittheilen will (Edinburg. med. journ. 1881 Sept.). Bei einer Frau, welche eine Inversion seit $5\frac{1}{2}$ Jahren hatte, waren vergebliche Repositionsversuche zu wiederholten Malen gemacht worden. Bei einem solchen neuen gab der Uterus allmählich nach und glaubte Verfasser dieses Berichtes die Reposition gelungen, als er zu seinem Schrecken bemerkte, dass er den Uterus durch einen Längsriss der hinteren Cervikalwand in die Peritonealhöhle gestossen habe. Gelingt ein Versuch der manuellen Reposition nicht leicht, so empfiehlt es sich eine Blutung abzuwarten und dann von neuem die Reposition zu versuchen, wie dieses der Fall von Alonso y Rubio (Anal. de la Soc. Gin. Esp. 1878) zeigt. Dasselbe empfiehlt auch Dr. Harris (Philadelphia). Auch soll günstig für die Reposition sein die Zeit nach der Menstruation, in welcher die Uterusgewebe weicher und nachgiebiger sind, weiter 7. oder 8. Woche nach dem Eintritt der Inversion, in welcher durch die Involution des Organes die Dicke verändert ist und geschlechtlicher Umgang. Dass letzterer einen Einfluss auf die Reductionsfähigkeit ausübt, zeigt ein Fall, den Prof. Dr. Howitz (cf. oben) referirt, in dem die Reduction durch den Gatten beim Coitus bewirkt wurde. Ein anderes, sicheres und zugleich mildes Verfahren ist die Ausübung eines permanenten elastischen Druckes mittelst eines Gummiballoons, welcher in die Scheide gebracht und dann entweder aufgeblasen oder mit Wasser gefüllt wird. Zur Unterstützung empfiehlt Tyler (cf. Americ. journ. of Obstetr. 1878) ein Jod-Glycerin-Carbottampon in der Zeit, in welcher man den Colpeurynter entfernt, einzulegen. Welche günstigen Resultate mit diesem Instrument erreicht werden, zeigen Fälle wie der von Bockenthal beschriebene (cf. Monatsschrift für Geburtsk. u. Frauenkr. XV. p. 313), in welchem die Reduction nach 6jährigem Bestehen gelang, der von Courty überlieferte (cf. Annales de Gynécologie Oct. 1878), in welchem innerhalb von 11 Tagen eine seit 4 Monaten bestehende Inversion geheilt wurde, der von Tyler (cf. Americ. journ. of obstr. 1878 XI. 578), wo eine 11jährige Inversion b

itigt wurde, oder auch der von Freund mitgetheilte (cf. oben) Fall, in dem nach $4\frac{3}{4}$ jährigem Bestehen die längere Anwendung des Colpeurynters zu einem erfolgreichen Ziele führten. Im ganzen finde ich 13 Fälle mit dem Colpeurynter mit Erfolg behandelt. Eine kleine Abänderung davon schlägt auch Tyler Smith vor. Man solle nämlich die Inversion, falls sie sich vor der Scheide befindet, in dieselbe zurückbringen, sodann ein Luftpassarium einlegen, es ein bis zwei Tage liegen lassen, hierauf entfernen und mehrere Minuten lang Manipulationen mit den Fingern am invertirten Organ ausführen. Diese Prozedur solle man so lange abwechselnd wiederholen, bis die Reduction gelingt.

Marion Sims räth, longitudinale Incisionen längs der Cervix zu machen, und zwar will er drei Incisionen gemacht haben, je eine an den Seiten und eine an der hinteren Fläche, letztere aus dem Grunde, weil, wenn die Patientin die linke Seitenlage einnimmt, dort die Einschnitte leichter, als an der Vorderfläche gemacht werden können. Der Zweck der Einschnitte ist der, die circulären Fasern des Uteringewebes zu durchschneiden und hierdurch eines der Haupthindernisse für die Reposition des Fundus aus dem Wege zu räumen (cf. M. S., Gebärmutterchirurgie 3. Aufl. p. 106). Nach dieser Methode wurde ein Fall von Hickmann (cf. The Lancet p. 271) behandelt. Nachdem bei einer 5 Monate bestehenden Inversion vergebliche Repositionsversuche gemacht worden, wurden mehrere Incisionen in die Cervix gemacht und darauf liess sich der Uterus partiell reinvertiren. Die complete Inversion kam dann spontan zu stande. In derselben Weise erfuhr Wilson (cf. oben) in einem 12 Monate bestehenden Falle von Inversion. Nach mehreren vergeblichen Repositionsversuchen mit der Hand und Colpeurynter machte W. in die im inneren Muttermunde befindliche Stricturestelle drei Incisionen, jede ca. $\frac{3}{4}$ " lang und $\frac{1}{4}$ " tief, und nun gelang die Reduction des Uterus sehr leicht unter dem bestimmten Gefühl der Zerreissung des Uterusgewebes. Der Operation folgte geringer Blutabfluss und in kurzem war die Patientin geheilt. Nach 4 Monaten stellte sich die Menstruation ein.

Eine andere merkwürdige Behandlungsart berichtet Dibard (cf. Annales de Gynécologie Jan. 1877). Eine 42jährige Frau hatte mehrere Male geboren und bei der letzten Geburt eine Inversion erlitten. 13 Jahre darauf kam sie D. wegen ununterbrochener, sehr schwächender Blutungen, welcher mehrere Versuche machte, den Uterus zu reponiren ohne dass es ihm gelang. Bei einer 8 Wochen später unternommenen Untersuchung fand er den Uterus in ganz normalen Verhältnissen und zugleich eine Schwangerschaft. Diese sowohl, wie das Wochenbett verliefen normal. Verfasser giebt seinen Reductionsversuchen keinen Antheil an der Heilung, sondern führt sie ganz allein auf die Schwangerschaft, d. h. die Wirkung des wachsenden Eies zurück. Eine Methode, die wohl niemand wegen der Gefährlichkeit nachahmen wird, giebt Thomas (cf. Diseases of women p. 428) an, nämlich Eröffnen des Abdomens und directe Einwirkung auf die Umstülpung unter Dilatation des Cervikalkanals. anderer Weise wurde verfahren von Emmet, welcher silberne Drahtschlingen durch die Muttermundslippen führte und diese dann unter dem invertirten Fundus vereinigte, um durch Herunterziehen der Muttermundslippen und des Collums zu wirken. Breithwaite (cf. Obstr. journ. of Great Britain 1878 Mai) construirte für einen seiner Fälle einen aus Hartgummi angefertigten ausgehöhlten Schaft, welcher durch eine Leibbinde befestigt getragen wurde und erzielte Erfolg. Ford (cf. oben) wendete, nachdem mehrere manuelle Repositionsversuche misslungen waren, ein tellerförmiges Hartgummipessar, auf welchem ein prominenter Wulst befestigt war, 10 Tage lang mit Erfolg an. Wieder ein anderes Instrument ersann John Byrne (cf. New-Yorker med. journ. 1878). In seinem Falle führte er eine Hartgummitasse mit 2 1/2 Zoll im inneren Durchmesser in die Scheide ein und leitete in dieselbe den invertirten Uterus. Eine zweite ähnliche Tasse mit einem vorzuschraubenden conischen Stempel wurde auf den Unterleib gesetzt und dann der Stempel lange vorgeschraubt, bis er in den Trichter des invertirten Uterus passte. Nun wurde der Boden der Tasse in die

scheide, der auch beweglich war, mit einer Schraube vorschoben, während die äussere Tasse mit Stempel einenegendruck ausübte. Allmählich erweiterte sich der Cervikalring, der Trichter wurde seichter und weiter und in Absätzen glitt der Fundus nach $\frac{1}{2}$ Stunde hinauf. Verasser giebt weiter noch an, dass Dr. Thomas mit seinem Instrument auch einen chronischen Fall geheilt habe. Wiederum n anderes Instrument ist angewandt in dem von Williams angegebenen Falle (cf. The obstetr. journ. No. LXXIII. 1879 April). Es wurde das napfförmige Ende eines Metallstiftes in den invertirten Fundus angesetzt und durch Ringe am anderen Ende des Stiftes 4 elastische Bänder angebracht, welche an einen um die Hüften gelegten breiten Heftpflasterreifen befestigt wurden, so dass ihr Zug wenigstens theilweise der Achse des kleinen Beckens entsprach. Bald traten heftige Schmerzen ein. Am folgenden Tage war die Inversion theilweise reponirt. Der Rest wurde durch den nochmals angelegten Apparat gehoben. Ein ähnliches, aber noch complicirteres Verfahren empfiehlt L. Tact (cf. Obstr. journ. No. LXIX 1878 p. 555). Er theilt die Operation in 3 Akte ein und nimmt dazu drei verschieden dicke Näpfchen, an denen ein 6" langer Stift mit zwei an seinen Enden befestigten elastischen Schnuren angebracht ist. Er will dadurch allmählich durch constanten Druck vorgehen und hofft durch diese Methode die Nothwendigkeit der Amputation noch mehr einzuschränken. Mehrere verschiedene Methoden wandte Stewens (cf. Boston med. and surg. journ. 1879 Febr.) bei einer 9 Monate bestehenden Inversion an. Zuerst versuchte er die manuelle Reposition in der von ihm (cf. oben) angegebenen Weise. Nach $1\frac{3}{4}$ Stunden war es gelungen, den Fundus fast ganz in die Uterushöhle zurückzuschieben, aber eine Fortsetzung widerrieth der Zustand der Patientin. Es wurde daher ein Colpeurynter eingelegt und zweimal während der nächsten 60 Stunden erneuert. Dann wurde unter Aethernarkose die manuelle Reposition wieder aufgenommen und dabei gelang es, den Fundus bis innerhalb des orificium externum zu bringen, als der Zustand der Pa-

tientin wieder zur Unterbrechung nöthigte. Nun wurden nach Emmet's Vorgange 4 tiefe Drahtsuturen durch die Muttermundslippen geführt und zugedreht. Etwa 1 Stunde später kamen heftige, Nachwehen ähnliche Schmerzen, welche $\frac{3}{4}$ Stunden dauerten. Am 2. Tage fand Verfasser nach Entfernung der Nähte den Uterus völlig reinvertirt. In einem von Gervis (cf. The obst. journ. of Gr. Brit. and Ird. 1879 Nov. p. 474) berichteten Falle gelang nach erfolgloser Taxisanwendung und der des Luftpessars die Reposition mit dem Aveling'schen doppelt gekrümmten Repositeur. In einem Falle wird behauptet (cf. W. F. Atla, siehe oben), dass nachdem die Bauchmuskeln durch Anästhesirung durch Chloroform relaxirt waren und die Patientin in die Kniebrustlage gebracht war, der invertirte Uterus durch den Luftdruck und durch seine Schwere reinvertirt worden sei. Die Luft war eingedrungen durch den in die Scheide eingeführten Sim'schen Löffel. S. Horn (cf. Toledo med. and. surg. journ. 1880) reponirte einen invertirten Uterus mittelst eines gläsernen Stöpsels und in einem anderen Falle mittelst eines einem alten hölzernen Stetoskop ähnlichen Instrumentes, das mit Beihilfe von Gummibändern einen constanten elastischen Druck auf den Fundus ausübte. Eine andere Behandlungsweise unternahm Prof. Howitz (cf. oben) in dem schon früher genannten Falle. Nachdem vergeblich ein Braun'scher Colpeurynter längere Zeit angewendet war, wurde ein eigenes dazu construirtes Repositorium angelegt. Als daraufhin auch die Inversion unverändert blieb, fing man dreimal täglich mit warmen Douchen an. Es wurden pilulae Blaui gegeben, 4 eiserne Fäden durch die Muttermundslippen gelegt, ein Gummiballon gegen den Fundus eingeführt, aufgeblasen und darauf die Fadenschlingen um den Ballon geschlossen. Nach einiger Zeit schnitten die Suturen durch. Darauf wurden von neuem warme Douchen angewendet und täglich Massage des Uterus vorgenommen. Unter dieser Behandlung, die anfangs Blutungen verursachte, wurde der Uterus deutlich kleiner. Darum wurde eine breite Polypenzange, an der die Branchen, wie an einer Geburtszange, vereinigt waren

en konnten, zu dem Grunde der Einstülpung hineingeführt, die Manubria vorsichtig auseinander entfernt und die Umstülpung stark dilatirt. Gleichzeitig wurde mit der Hand die Stelle der Tubarmündungen nach oben gedrückt. Nachdem dieses Verfahren öfter wiederholt worden war und nebenbei secale gegeben war, fühlte Patientin eines Tages etwas wie eine starke Wehe und die Untersuchung ergab die Reinversion. In der darauf folgenden Besprechung der angewandten Mittel legt Verfasser ein grosses Gewicht auf die warmen Vaginaldouchen, welche die grosse Neigung des Uterus zu starken Blutungen bei Berührung und die Disposition desselben und der umgebenden Theile zu Entzündungen, die oft grosse Hindernisse für eine Wiederholung von Repositionsversuchung, Anwendung des Colpeurynters und ähnlicher Mittel bilden, herabsetzten und auch auf die Massage, welche theils das Volumen des Uterus verminderte, theils die Irritabilität abstumpfte, so dass die Muskelcontraction erschwände, den stärksten Werth aber auf die Anwendung der Zange, welche dehnend gewirkt hätte, ohne zugleich Gewalt auszuüben. Wieder ein anderes Instrument erfand Kocks (cf. Berliner klinische Wochenschrift 1881 No. 33) für den von ihm veröffentlichten Fall. Er liess, nachdem Colpeuryse vergebens gewesen, einen Tampon anfertigen, der eine einfache sphärische Oberfläche hatte, sondern bei welchem diese durch einen Trichter unterbrochen wurde. Der Uterus sollte in diesen Trichter aufgenommen und beim Anfüllen mit Luft oder Wasser allseitig comprimirt und gleichzeitig nach oben gedrängt werden. Der Trichter befand sich daher nicht oben in der Mitte des Tampons, also nicht dem Ausflussrohr gegenüber, sondern etwas seitlich, damit, wenn der Uterus sich in das Innere der Cervix zurückgezogen hätte, ohne ganz reinvertirt zu sein, man den Trichter umstülpen und dann den mit einem Conus versehenen Tampon so einführen könne, dass der Kegel vorn als Keil in die Cervix eingepresst würde und nun den Uteruskörper weiter nach oben zu treten zwänge. Die Anwendung dieses Instrumentes geschah mit vollständigem Erfolge. Er-

wähnenswerth ist noch, dass, trotzdem die Inversion eine complete war, der Uterus die Vagina nie verlassen hatte.

Dieser Reihe von Fällen von Reduction mittelst instrumenteller Behandlung habe ich noch einige Fälle hinzu zufügen, in denen die Rückstülpung spontan erfolgte. Die Glaubwürdigkeit solcher Fälle war lange bezweifelt worden, bis der von Spiegelberg mitgetheilte Fall, welchen er selbst beobachtet, dieses Vorkommen ausser Zweifel stellte. Der Fall von Sp. (cf. Archiv f. Gynäk. V., p. 119) betrifft eine 40jährige Mehrgebärende. Die Inversion bestand 3 Monate. Während des zweiwöchentlichen Aufenthaltes in der Klinik, in dem sie starken Darmkatarrh und heftige Durchfälle hatte, erfolgte bei ruhiger Bettlage die spontane Reversion. Von Empfindungen, die mit dem Vorgange der Reduction in Zusammenhang zu bringen wären, wusste die Person nicht anzugeben. Zu diesem Falle erwähnt Spiegelberg 8 Fälle aus der Literatur von Leroux, de la Barre, Baudelocque, Thatcher, Meigs, Hatsch, Rendu und Shaw, in denen auch die Reduction spontan, ohne Zuthun eines Menschen erfolgt war. Ein gleicher Fall findet sich noch von Grassi (cf. Le Sperimentale 1877, Nr. 7) mitgetheilt. Auch in diesem waren Repositionsversuche vergeblich gewesen. Es wurde nun Ergotin innerlich gegeben und ein mit adstringirender Flüssigkeit getränkter Tampon in die Scheide eingelegt. Als nach zwei Tagen der Tampon entfernt wurde, fand sich der Uterus reinvertirt.

Gelingt es auf keine Weise die Inversion zu beseitigen, so muss man, wenn der Zustand schwer erträglich ist, zur Abtragung des Uterus schreiten. Dieselbe kann man vornehmen durch die Ligatur, oder durch den Ecraseur, oder auf blutigem Wege mit Messer oder Scheere oder durch eine Combination dieser Methoden oder auf galvanokaustischem Wege. Was die Ligatur anlangt, so bediente man sich früher dazu einer festen Schnur, Darmseite oder eines Drahtes, jetzt bringt man überall, wo man sie bevorzugt, die von Dittel empfohlene Methode in Anwendung, welche in der Benutzung eines festen elastischen Gummiröhrchens

der noch besser einer Gummischnur besteht. Auf eine dieser Methoden wurden von den von mir gesammelten Fällen folgende behandelt:

Bei einer 37jährigen Frau (cf. Ashwell Lehrbuch der Krankh. des weibl. Geschlechts, p. 202) waren Repositionsversuche bei einer 3 Monate bestehenden Inversion erfolglos gewesen. Es wurde daher die Ablösung beschlossen mittelst Unterbindung. Die Ligatur bestand aus einem dicken Seidenfaden, welcher fast unmittelbar unter dem Muttermunde gelegt wurde. Nach der Operation klagte die Kranke über ein Gefühl von Unbehaglichkeit in der Unterbauchgegend. Als dann die Ligatur fester gezogen wurde, entstanden grosse Schmerzen, was eine Lockerung derselben veranlasste. Nach mehrmaligem allmählichem Festerziehen der Ligatur fiel die Geschwulst ab. Heilung. Einen andern Fall beschreibt Hickmann (cf. The Lancet, p. 271). Nachdem die Pexis verschiedene Male erfolglos versucht, schritt man zur Amputation des invertirten Uterus, welcher knorpelhart war. Nach der Abtragung konnte man in der Mitte die durchgeschnittene Tube sehen. Der Stiel wurde kauterisirt. Am 29. Tage nach der Operation trat der Tod in Folge allgemeiner Peritonitis ein. Dr. Godson erzählt zwei Fälle von Inversion, welche beide 2½ Jahre alt waren, welche mittelst des Ecraseurs mit Erfolg entfernt wurden. Maberly hat ebenfalls in einem Falle den Uterus durch den Ecraseur günstig entfernt. Ein Fall (cf. Nyrep. Centralblatt f. Gynäkolog. 1877) wurde in der Klinik des Prof. Howitz amputirt nach 1½jährigem Bestehen mittelst eines dicken Eisenfadens und Galvanokaustik. Der Faden wurde in der Gegend des orificium internum doppelt eingeführt und der Uteruskörper in zwei Theilen abgeschnürt. 3“ darunter wurde eine galvanokaustische Schlinge angelegt, und die halbe Dicke der Wand durchgeschnitten. Dann wurde die Operation abgebrochen und die Schlinge mit ihrem Handgriff blieb liegen. Nach zwei Tagen zerbrach die Schlinge, als die Operation vollendet werden sollte. Der Uteruskörper zeigte sich als eine graue, wallnussgrosse pulpöse Masse,

von dem frisch granulirenden orificium umgeben. Am nächsten Tage lagen die eisernen Fäden lose in der Vagina; vom Uterus wurde nur der rothe, weit offen stehende Muttermund entdeckt, $\frac{1}{2}$ “ darüber im Cervikalkanal ein Diaphragma von granulirender rother Farbe und in dessen Mitte eine Querspalte, aus welcher graue Flüssigkeit sich entleerte. 3 Monate nach der Operation war die Patientin völlig geheilt. Spencer Wells (cf. Brit. med. journ. 1877) legte bei einer Primipara nach 12monatlichem Bestehen der Inversion zuerst zwei Nadeln durch die Cervix und darüber eine elastische Ligatur, um ja kein Blut zu verlieren. Unterhalb derselben wurde dann der Gebärmutterkörper mit dem Paquelin'schen Glüheisen abgetragen. Am 12. Tage nach der Operation wurde die eine Nadel und am 16. Tage die zweite entfernt und Patientin bald darauf geheilt entlassen. Morgagni trug (cf. Centralblatt f. G. 1879, p. 126) den Uterus in einem Falle mit Messer und Scheere etwa 1 cm. unter einem mit einem Schlingenschnürer eingelegten Drahtligatur ab. Den Schlingenschnürer selbst liess er dann noch 24 Stunden liegen. 8 Tage nach der Operation ging die Heilung gut von statten. Hue (cf. Progr. med. 1879 Nr. 24) entfernte den invertirten Uterus in einem Falle mittelst einer elastischen Ligatur. Nach 14 Tagen war der Uterus abgestossen. Heilung. Poinso (cf. Progr. med. 1880 Nr. 28) führte einmal die Abtragung des Uterus auch mittelst einer elastischen Ligatur aus und verlief die Operation ohne jegliche Blutung. 10 Tage später war die Geschwulst nicht mehr zu fühlen. Am 12. Tage fiel die Ligatur ab und die Kranke ging in vollständige Genesung über. Wodiagin (cf. Med. Rundschau 1880) berichtet von 4 Fällen von Amputation. Die Methode war in allen die Ligatur mit einem Draht. Die Geschwulst fiel nach 8 bis 14 Tagen ab. Bei allen Patientinnen zeigte sich trotz desinficirender Ausspülung Fieber, bei einer Zeichen von Septicämie, doch genesen alle. Macdonald (cf. Edinburg med. journ. 1881 Sept.) legte zuerst einen Dactecraseur zur Abtragung des Uterus an und als dieser platzte, schnitt er ihn weiter mit der Scheere ab.

Darauf legte er zwei Nadeln durch die ganze Dicke der invertirten Cervix. Tuben und je ein Gefäß beiderseits wurden mit Silberdraht unterbunden. Nach der Operation trat rasche Heilung ein. Unter den in der Breslauer Klinik beobachteten Fällen würde in dem einen Falle um den Uterus zwischen Körper und Halstheil ein starker seidener Faden gelegt, und mit einem Kilian'schen Schnürer zusammengeschnürt und dann mit der galvanokaustischen Schlinge der Uterus völlig abgetrennt (cf. Archiv f. Gyn. IV., p. 355) und in einem zweiten Falle wurde mit elastischer Ligatur und zuletzt mit dem Ecraseur die Abtragung des Organs vorgenommen (cf. Archiv f. Gyn. XII., p. 233) und in einem dritten ebenfalls die elastische Ligatur, welcher wieder der Ecraseur folgte, angewandt. Alle drei Fälle wurden geheilt entlassen. Somit endigten also alle 16 als gerirt angeführten Fälle, in welchen die Amputation des Uterus vorgenommen wurde, mit Heilung und zwar mit

	Unterbindung	Unterbindung mit galv. Schlinge	Ecraseur	Messer und Kauterisation	Paquelin	Drahtligatur und Messer	Elastische Ligatur und Ecraseur	Ecraseur und Scheere
Zahl d. Fälle	5	2	3	1	1	1	2	1

Eine andere Zusammenstellung giebt West (cf. Diseases of women p. 235).

	Zahl der Fälle	Gestorben	Genesen	Operation aufgegeben.
Entfernung des Uterus d. Ligatur	45	33	10	2
Ecraseur oder Messer . . .	5	3	2	—
Combination von Ligatur, Messer oder Ecraseur . .	9	6	3	—

Eine dritte Zusammenstellung giebt Barnes (cf. medico-chirurgical transactions 1859), wobei 6 verschiedene Methoden zur Anwendung kommen.

	Zahl der Fälle mit Erfolg	Zahl der Fälle ohne Erf.	Von diesen starben	Operation auf- gegeben.
I. Ligatur ^u allein	26	10	8	2
II. Ligatur und Excision .	9	3	3	—
III. Excision	3	2	2	—
IV. Continuirlicher Druck	mehrere	—	—	—
V. Continuirlicher elasti- scher Druck	7 mit Er- folg ein- gerichtet	—	1	3—4
VI. Gewaltsame Taxis . .	6	4	4	—

Aus diesen Zusammenstellungen ergibt sich, dass dem günstigsten Erfolg die Abtragung durch die Ligatur oder die auf blutigem Wege aufzuweisen hat. Auch hat W. Clintock (cf. Clinical memoirs of disenses of women, p. 107) über 8 Fälle von chronischer Inversion berichtet, welche im Dublin vorgekommen und von ihm, Dr. Clarke und Dr. Johnston mittelst Exstirpation behandelt worden sind und welche alle einen günstigen Verlauf genommen haben.

Endlich will ich noch eines merkwürdigen Falles Erwähnung thun (cf. Ashwell Lehrbuch der Krankh. des weibl. Geschlechts, p. 199), in welchem die beschlossene Exstirpation des Uterus unterblieb, weil eine Selbstheilung eintrat. Die zu wiederholten Malen angestellten Repositionsversuche waren vergeblich gewesen, während starker blutiger Ausfluss, der später eitrig und schleimig wurde, und anhaltende Diarrhöen die Kräfte der Patientin sehr herunterbrachten. Dr. Radford, welcher die Kranke behandelte, dachte daher an die Exstirpation. Diese aber wurde nicht ausgeführt, da sich der Umfang der Gebärmutter von selbst sichtlich verkleinerte. Die Vaginalportion schnürte die Basis der Geschwulst fest ein. Der Ausfluss nahm immer mehr einen eitrigen Charakter an und bei der Untersuchung 7 Monate nach der Geburt konnte man kaum noch eine Geschwulst entdecken. Am oberen Ende der Scheide, die

ast wie ein Blindsack endigte, fanden sich nur noch Reste der unregelmässig contrahirten Vaginalportion; eine regelmässige Oeffnung, welche man für den Muttermund hätte halten können, konnte nicht aufgefunden werden.

Nachdem ich nun so der einschlägigen Literatur in eingehender Weise Erwähnung gethan, schreite ich zum zweiten Theil meiner Arbeit, nämlich zur Mittheilung des Falles, welcher in der Breslauer Gynäkologischen Klinik gelegen und dort mit günstigem Erfolg durch Colpeuryse behandelt worden war.

Krankengeschichte.

Pauline Hampel aus Hermsdorf am Kynast, 25 Jahre alt, wurde am 21. Mai vorigen Jahres in die hiesige gynäkologische Klinik aufgenommen. Bei ihrem Eintritt gab sie an, früher immer ganz gesund gewesen zu sein. Die Menstruation hat sie zum ersten Male in ihrem fünfzehnten Jahre bekommen und wiederholte sich dieselbe von da ab alle vier Wochen regelmässig, ziemlich spärlich, schmerzlos, bis zu einer Dauer von acht Tagen. Patientin ist seit 2 Jahren verheirathet und hat zweimal spontan entbunden. Nach der ersten Entbindung, welche normal statthatte, verlief das Wochenbett normal. Nach der zweiten Entbindung, die vor einem Jahre erfolgt war, lag Patientin 10 Wochen krank. Seit dieser Zeit litt Patientin an fortwährenden, bald stärken, bald schwächen Blutungen. Dabei trat in der letztern Zeit die Regel wieder einige Male auf, markirte sich deutlich und dauerte jedesmal 14 Tage. In Folge dieses Blutverlustes wurde die Kranke hochgradig schwach und musste den grössten Theil des letzten Jahres im Bette zubringen. Dabei hatte sie aber keinerlei Schmerzen im Leibe. Ferner gab Patientin an, seit der Geburt an Obstipation, nicht aber an Urinbeschwerden gelitten zu haben. Die bisherige Behandlung, die von Dr. Müller in Warmbrunn, der das Leiden der Patientin richtig erkannt hatte, geleitet wurde, bestand in Scheidentamponade, Repositionsversuchen

mit der Hand und dem Colpeurynter, wurde aber von keinem Erfolge begleitet.

Der Befund, welcher in der Klinik erhoben wurde, ist folgender: Mittelgrosse, gracil gebaute Person mit mässig entwickelter Mnskulatur und dünnem Fettpolster. Haut nicht bloss im Gesicht, sondern auch überall am Körper sehr blass und ebenso tragen die Schleimhäute die Zeichen äusserster Anämie. Brustorgane gesund, Herztöne schwach, rein und regelmässig. Puls klein und leicht unterdrückbar, aber regelmässig. Mammae zeigen ziemlich starke Atrophie. Die Untersuchung des Unterleibes bietet nichts Abnormes dar, mit Ausnahme eines reichlich wallnussgrossen, circumscripten, harten Tumors, der subcutan, rechts oben vom Nabel befindlich ist und mit auf die Welt gebracht sein soll. Die Natur dieses in seiner Form nicht veränderten Tumors liess sich nicht feststellen und wurde auch gegen ihn, da er keinerlei Symptome machte, nichts vorgenommen. Bei der Palpation des Unterleibes fehlt an der normalen Stelle der Uterus, von dem man aber den Inversionstrichter deutlich fühlt. Die äussern Genitalien sind normal entwickelt. Scheideneingang ist ziemlich weit, die Scheide weit und kurz und ihre Wände sind sehr blass und schlaff. Der untersuchende Finger stösst bald nach dem Eindringen in die Scheide auf einen ca. klein apfelgrossen, rundlichen, glatten, ebenen, ziemlich harten Tumor, der die Gegend der nicht vorhandenen Portio einnimmt. Rings um die grösste Peripherie des Tumors befindet sich ein scharfgespannter Saum, ähnlich wie die verstreichende Cervix um den kindlichen Kopf. Zwischen diesem Saume und dem Tumor kann man mit dem Finger etwa 2 cm. weit in die Höhe eindringen und in dieser Höhe scheint der umgebende Saum mit dem Tumor verwachsen. Bimanuelle Untersuchung vom Scheide und Bauchdecken aus lässt auch ein normales corpus uteri vermissen und dabei fühlt man die in den Inversionstrichter sich einsenkenden Tubarmündungen. Die Schmerzhaftigkeit des Tumors ist gering. Mit der Uterus-sonde gelingt es, zwischen den Muttermundslippen und dem

on ihnen umfassten Tumor überall einzudringen mit einem —5 cm. langen Abschnitt der Sonde.

Da nun somit die vaginale Untersuchung mit genügender Sicherheit die richtige Diagnose *inversio uteri completa* ergab, so wurde von weitem Untersuchungsmethoden, als da sind Untersuchung mit dem Sim'schen Spiegel, bimanuelle Untersuchung vom Mastdarm und Bauchdecken, vom Mastdarm und der Blase aus mit in dieselbe eingeführtem Katheter Abstand genommen. Es handelte sich nun nur noch darum, sich zu entscheiden, ob nach Maassgabe des Uebels und der Dauer desselben, namentlich da schon zu Hause längere Zeit angestellte Repositionsversuche erfolglos waren, noch eine *restitutio ad integrum*, d. h. eine Reversion erstrebt werden könnte, oder ob nach Aufgeben dieser Absicht zur Amputation des Organes man sich mehr hinneigen sollte. Die neuern, fast an das Unglaubliche grenzenden Erfahrungen über gelungene Repositionen nach vieljährigem Bestehen der Inversion veranlassten, zunächst an einen solchen Versuch zu denken, und zwar wurde dabei dem forcirten kurzdauernden Drucke der permanent wirkende, elastische vorgezogen. Es bestand also die Behandlung zuerst in Scheidenausspülungen und Einlegen eines Colpeurynters, der anfangs nicht besonders gut vertragen wurde. Der Colpeurynter wurde am 23. V. 83 früh zum ersten Male und mit dem Munde aufgeblasen. Temperatur $37,2^{\circ}$; Puls 86 p. M. Abends trat Urinretention ein. Der Colpeurynter drückte auf die Harnröhrenmündung, und musste daher zur Ermöglichung der Katheterisation etwas Luft aus dem Colpeurynter entfernt werden. Temp. $37,5^{\circ}$; Puls 88.

24. V. Patientin hat spontan Urin gelassen. Der nun nur noch schwach gefüllte Colpeurynter wurde wieder aufgeblasen. Beschwerden waren gering, nur war etwas Druckgefühl vorhanden. Früh Temp. $37,2^{\circ}$; Puls 100; Abends Temp. $37,5^{\circ}$; Puls 96.

25. V. Der Colpeurynter blieb gut liegen. Es stellten sich Schmerzen im Kreuz ein, sonst war das Allgemeinbefinden der Patientin, abgesehen von der grossen Schwäche,

ein gutes. Früh Temp. $37,2^{\circ}$, Puls 96. Abends Temp. $37,5^{\circ}$, Puls 100.

26. V. Der Colpeurynter wurde früh entfernt mit stark stinkendem Secret bedeckt. In Folge dessen wurden Ausspülungen der Scheide vorgenommen. Temp. $37,9^{\circ}$, Puls 96. Die Untersuchung ergab, dass der Uterus seinen abnormen Platz unverändert beibehalten. Es wurde nun ein neuer etwas kleinerer, aber besser an den Uterus sich anlegendes Colpeurynter eingelegt und kräftig mit einer Spritze aufgeblasen. Abends Fieber, Kopfschmerzen, Unwohlsein. Temp. $38,3^{\circ}$, Puls 120. In Folge davon Entfernung des Colpeurynters.

Aus der Scheide floss eitrig, etwas blutig tingirter, übelriechender Ausfluss. Scheidenausspülungen.

27. V. Der Morgens bei fieberfreier Temperatur (Temp. $37,4^{\circ}$, Puls 100) wieder eingelegte Colpeurynter musste Abends abermals wegen Fiebers entfernt werden. Temp. $38,9^{\circ}$, Puls 112. Schmerzen waren im Kreuz vorhanden stärker als vorher, und ebenso im Unterleibe.

28. V. Die innere Untersuchung ergab früh, dass in zwischen der fundus uteri ein ziemlich bedeutendes Stück nach oben gerückt war, so dass er von den Muttermundslippen nunmehr nur nach unten zu noch überragt wurde. Trotz dieses Erfolges wurde, einmal wegen des zu langsamen Resultates und andererseits weil der Colpeurynter schlecht vertragen wurde, indem er die eitrige Secretion veranlasste (früh. Temp. $37,0^{\circ}$, Puls 80; Abends Temp. $37,5^{\circ}$, Puls 80), am 29. V. ein manueller Repositionsversuch unternommen. Die Patientin wurde zu diesem Zwecke in tiefer Chloroformnarkose in Steinschnittlage gebracht. Dann wurden die Lippen der Portio mit einer Myzeux'schen Zange herabgezogen und der invertirte Uterusfundus zuerst mit dem Finger, dann mit Obturatoren kräftig nach oben gedrückt. Bei dieser Manipulation riss eine Myzeux'sche Zange ein Stück aus der hintern Muttermundlippe aus. Da nun somit trotz grössern Kraftaufwandes kein wesentlicher Erfolg erzielt wurde, denn die Untersuchung zeigte den Stand des

undus kaum etwas verändert, so wurde eine Scheidenausspülung gemacht und wegen der Blutung aus den Einrissen der Myzeux'schen Zange eine Scheidentamponade vorgenommen. Früh Temp. $36,9^{\circ}$, Puls 96; Abends Temp. $37,6^{\circ}$, Puls 104.

30. V. Der Scheidentampon wurde entfernt und der Colpeurynter wieder von neuem eingelegt. Früh Temp. $37,2^{\circ}$, Puls 80; Abends Temp. $37,4^{\circ}$, Puls 100.

31. V. Der Colpeurynter musste abermals wegen Fieber entfernt werden. Früh Temp. $38,7^{\circ}$, Puls 108, Abends $38,9^{\circ}$, Puls 108. Eitriger Ausfluss. Scheidenausspülung.

I. VI. Patientin fühlt sich ziemlich wohl, hat kein Fieber. Der fundus uteri ist kaum noch durch den weit geöffneten Cervikalkanal zu fühlen.

2. u. 3. VI. wurde nichts unternommen. Patientin fühlte sich, abgesehen von der Schwäche, wohl. Temperatur am 2. früh $36,9^{\circ}$, Puls 96; abends Temp. $37,6^{\circ}$, Puls 100; am 3. früh Temp. 37° , Puls 120; abends Temp. $36,8^{\circ}$, Puls 104.

3. VI. Die Untersuchung ergab die inzwischen vollständig erfolgte Reinversion des fundus uteri. Patientin bekam von nun an mehr Farbe, konnte den grössten Theil des Tages ausserhalb des Bettes sein und klagte nur noch über bedeutende Müdigkeit und Schwäche in den Beinen.

9. VI. Patientin wurde entlassen. Bei der nochmals vorgenommenen Untersuchung stellte die Portio einen weichen, unebenen, an mehreren Stellen eingerissenen Ring dar, durch welchen man leicht bis an das orificium internum gelangte. Vom fundus war nichts mehr zu fühlen. Die mit der Uterussonde angestellte Untersuchung ergab eine Entfernung des inneren Muttermundes vom Fundus von 5 bis 6 cm. Es zeigten sich keine Blutungen mehr und auch keine sonstigen Beschwerden von seiten der Genitalien. Das Allgemeinbefinden war nun im Vergleich zu dem bei der Aufnahme ein bedeutend besseres geworden, wenn auch ein beträchtlicher Grad von Anämie noch vorhanden war. Appetit und Verdauung gut.

Fragen wir nun in diesem Falle, welches die Veranlassung gewesen ist zu der Inversion des Uterus, so lässt sich darüber wie auch in vielen anderen Fällen der Art, nichts Bestimmtes angeben. Nur soviel lässt sich vielleicht mit Sicherheit behaupten, dass irgend ein gewaltsamer Eingriff von seiten der die Entbindung überwachenden Person bei der zweiten Geburt vor einem Jahre auszuschliessen ist, da nach Angabe der Patientin die erste, wie die zweite Entbindung spontan erfolgten; vielmehr ist wahrscheinlich, dass während der zweiten Geburt, in Folge eines im Uterus selbst gelegenen Grundes, mag dies nun Lähmung der Placentarstelle oder sonst etwas Derartiges sein, eine Einstülpung sich gebildet hat, aus welcher sich dann in den ersten 10 Wochen nach der Entbindung, während welcher Zeit die Wöchnerin krank lag, sich die völlige Inversion entwickelt hat. Für dieses allmähliche Entstehen sprechen auch die verhältnissmässig milden Erscheinungen, unter denen das Leiden auftrat, denn ausser den Blutungen und dem daraus resultirenden Verfall der Kranken finden sich weiter keine Symptome. Auch in bei diesem Falle bemerkenswerth, dass nicht so sehr die Grösse des invertirten Organs das Hinderniss für die Reposition abgab, als vielmehr die ausserordentliche Härte desselben, welche ähnlich war der eines in normaler Weite gut contrahirten Uterus, bei welchem sich ja auch selbst herausgeschnitten und wenige Minuten nach vollendeter Entbindung eine künstliche Inversion kaum herstellen lässt. Diesem Umstande ist es aber auch hinwiederum zu danken, dass kein tödtlicher plötzlicher Blutverlust eintrat.

In Bezug auf die Behandlung spricht der Fall nicht für Repositionsversuche manueller Art, sondern für die schon seit mehreren Dezennien von Tyler Smith in die Praxis eingeführte und von da ab in vielen Fällen von längere Zeit bestandenen Inversionen mit Glück erprobte Behandlung mit dem Colpeurynter und möchte ich demnach überhaupt bei chronischen Inversionen mit Unterlassung jeden Repositionsversuches für Colpeuryse stimmen. Denn während die manuellen Repositionsversuche nicht zum erwünschten Ziele

führten, selbst als ziemlich grosse Kraft angewendet wurde, was das Ausreissen der Myzeux'schen Zange beweist bei normalem Uterusgewebe, sehen wir einen glänzenden Erfolg von der längere Zeit angewandten Colpeuryse. Auch ist dieses Verfahren gegenüber dem anderen ein durchaus mildes und möglichst schonendes. Denn durch gewaltsame, plötzliche Reposition können leicht Verletzungen und Zerreissungen der Theile entstehen und es werden dadurch auch heftige Schmerzen der Kranken verursacht, welche es nöthig machen, diese Operation nur unter Chloroformnarkose zu unternehmen, was doch auch wieder bei einer durch die langdauernden Blutungen geschwächten und heruntergekommenen Person, wie es doch die meisten sind, seine Bedenken hat. Der durch den Colpeurynter ausgeübte Druck dagegen ist ungefährlich und die durch ihn verursachten Schmerzen können auch erträglich gemacht werden, da doch der Druck durch Füllen oder Ablassen von Luft oder Wasser gesteigert oder vermindert werden kann. Die Wirkung des Colpeurynters, der, wenn er mit Erfolg angewendet werden soll, gut anschliessen muss, — denn auch unser Fall zeigt mit dem zweiten gut anschliessenden kleineren Colpeurynter guten Erfolg, mit dem ersten wenig — ist einmal starkes Auseinanderdehnen der Vaginalwandungen, namentlich in den oberen Partien, und zweitens Drücken des fundus uteri nach oben. Durch die Dehnung des Scheidengrundes wird ein fortwährender Zug auf die Insertionsstelle der Vagina in die Cervix ausgeübt und somit letztere auseinandergezogen und damit auch die Stelle, an deren Enge gerade ein Haupthinderniss für die Reinversion liegt, nämlich das orificium internum uteri. Gleichzeitig mit der Erweiterung des Cervikalkanals tritt aber auch ein mehr nach unten Treten desselben ein, so dass er also über das corpus uteri herübergestülpt wird. Ein drittes Moment für die Dilatation der Cervix ist das directe Emporgedrücktwerden des Fundus. Weiter wird durch den Colpeurynter der Uterus selbst comprimirt und verkleinert oder erweicht und so für die Rückstülpung geeigneter gemacht. Hat nun der Colpeurynter

den invertirten Uterus über das orificium internum empor gedrängt, so treten die durch ihn erregten Wehen — denn die während dieser Behandlung eintretenden Schmerzen im Kreuz und Unterleib sind doch nichts weiter als Wehen — in Thätigkeit, welche die vollständige Rückstülpung bewirken. Um aber die Eiterung, welche auf die Behandlung so lästig und verlängernd einwirkt, zu verhindern, empfiehlt es sich, jedesmal nach Entfernung des Colpeurynters Auspülungen der Scheide zu machen und den Colpeurynter mit Jodoform einzupulvern.



Vita.

Geboren wurde ich, Maximilian August Ferdinand Paul zu Breslau, den 15. November 1859 als Sohn des daselbst im Jahre 1860 verstorbenen Züchnermeisters August Paul und römisch-katholisch getauft. Nachdem ich die elementaren Vorkenntnisse durch häuslichen Unterricht und auf der Vorschule des kgl. katholischen St. Matthias-Gymnasiums zu Breslau mir erworben hatte, wurde ich Michaelis 1869 in die Sexta obigen Gymnasiums aufgenommen, dem ich bis zum August 1879 als Zögling angehörte. Nachdem ich im Juli 1879 das Abiturienten-Examen bestanden hatte, bezog ich im October desselben Jahres die Universität zu Breslau, um Medicin zu studiren, wendete mich aber in meinem ersten Semester philosophischen und geschichtlichen Studien zu. In dieser Zeit besuchte ich die Vorlesungen der Herren Professoren DDr. Dilthey, Dove, Neumann, A. Schulz. Um meinen militärischen Pflichten durch Ableistung des einjährig-freiwilligen Dienstjahres Genüge zu leisten, trat ich am 1. April 1880 in der zweiten Compagnie des vierten Niederschlesischen Infanterie-Regiments Nr. 51 ein und wurde dann am 1. October desselben Jahres entlassen. Im Mai 1882 bestand ich das tentamen physicum. Vom 1. April bis 1. October 1882 war ich als Unterassistent an der Königl. chirurgischen Klinik thätig. Mitte Februar dieses Jahres bestand ich das examen rigorosum.

Während meiner medicinischen Studienzeit besuchte ich die Vorlesungen und Kliniken folgender Herren Professoren und Docenten:

DDr. Berger, Biermer, Buchwald, Ferdinand Cohn, Hermann Cohn, Fischer, Förster, Fritsch, Grützner, Gscheidlen, Haeser, Hasse, Heidenhain, Hirt, Joseph, Kolaczek, Loewig, Meyer, Neisser, Ponfick, Richter, Sommerbrodt, Strasser, Unverricht, Wiener.

Allen diesen meinen hochverehrten Herren Lehrern erlaube ich mir, an dieser Stelle meinen wärmsten Dank auszusprechen.

Thesen.

1. Bei inversio uteri ist die Colpeuryse die beste Repositionsmethode.
 2. Lupus ist eine lokale Tuberkulose der Haut.
 3. Durch Excision der syphilitischen Initialsclerose und der entsprechenden Drüsen kann man die Allgemeinerkrankung verhindern.
-